

# TACO

Herbicida del grupo Dinitroanilinas

Concentrado Emulsionable EC



## Composición:

Pendimetalina ..... 33%

## Actividad/Propiedades:

Herbicida selectivo de acción pre - y post-emergente temprana. Se absorbe por las raíces en cantidades limitadas. Inhibe la división celular durante la mitosis tanto en los meristemas apicales como radiculares. La absorción por los brotes es el factor más importante en el control de las especies de hoja ancha. TACO no controla malas hierbas perennes.

## Aplicaciones:

Algodón: Pira (*Amaranthus dubius*), Cadillo bravo (*Cenchrus echinatus*), Pelo de Indio (*Cynodon dactylon*), Paja americana (*Echinochloa colonum*), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Paja morada (*Leptochloa filiformis*), Paja peluda (*Rottboellia exalta*), Limpia botella (*Setaria faberii*), Verdolagón (*Trianthema portulacastrum*), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Paja rolito (*Ischaemum rugosum*).

Arroz: Paja rolito (*Ischaemum rugosum*), Paja americana (*Echinochloa colonum*), Cola de zorro (*Leptochloa filiformis*).

Maíz y Sorgo: Paja rolito (*Ischaemum rugosum*), Paja peluda (*Rottboellia exalta*), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Pira (*Amaranthus dubius*), Falso Jonson (*Sorghum verticilliflorum*).

DOSIS DE APLICACIÓN: 3 a 5 Lts/Ha.

