

# DART

Insecticida Benzoilurea – Inhibidor de Quitina

Suspensión Concentrada CS



## Composición:

Teflubenzuron ..... 15%

## Actividad/Propiedades:

Producto recomendado en los programas de control integrado de plagas (CIP).

En caso de alta presencia de adultos o estadios muy avanzados de la plaga se recomienda aplicar DART en mezcla con otro insecticida de Reveex Agrícola, a objeto de lograr un control integral, recomendamos: CYPERPLAN, DALLA, ALDEBARAN, CITRIPLAN, DOGO Y ABAVEEX.

Gracias a su baja solubilidad en agua (0,02 mg/L), DART presenta una excelente persistencia y resistencia al lavado por lluvia.

DART no favorece el desarrollo de la araña roja ni produce Russeting en los frutos. DART constituye una excelente herramienta para romper resistencias del insecto frente a Organofosforados y Piretroides.

## Aplicaciones:

Algodón: Gusano Alabama (*Alabama argillacea*). DOSIS DE APLICACIÓN: 100 – 150 ML/Ha.

Hortícolas: Perforador de fruto (*Neuleucinodes elegantalis*), Falso Medidor (*Trichoplusia ni*), Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*), Pasador (*Liriomiza spp*), Minador (*Scrobipalpa absoluta*). DOSIS DE APLICACIÓN: 250 – 400 ML/Ha.

Maíz y Sorgo: Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*), Perforador de fruto (*Neuleucinodes elegantalis*), Gusano Alabama (*Alabama argillacea*). DOSIS DE APLICACIÓN: 1L/6 Ha.

Papa: Minadores (*Phithonmacea oercullela*). DOSIS DE APLICACIÓN: 100 – 150 ML/Ha.

